



پاسخ پرسش‌های درون فصل ۱

صفحه ۲ مایید بیاز را خود

(1)

دوره زمانی	۱۳۳۰_۱۳۳۵	۱۳۶۵_۱۳۷۰	۱۳۹۰_۱۳۹۵
درصد جمعیت	٪۳	٪۷	حدود ۱%

٣٠٪

پ) ۷۰—۶۰ سال

ت) افرايش يافته است. به دليل افزايش سطح آگاهی مردم، سلامت جامعه، سلامت محیط زیست، نوع تغذیه و... اميد به زندگی زاد شده است.

سال ۷۰—۸۰



صفحه ۴ مایید بیاز را خود


نام ماده	فرمول شیمیایی	محلول در آب	محلول در هگزان
اتین گلیکول (ضدیخ)	$\text{CH}_3\text{OHCH}_2\text{OH}$	✓	✗
نمک خوراکی	NaCl	✓	✗
بنزین	C_6H_{14}	✗	✓
اوره	$\text{CO}(\text{NH}_2)_2$	✓	✗
روغن زیتون	$\text{C}_{57}\text{H}_{104}\text{O}_6$	✗	✓
وازیلن	$\text{C}_{15}\text{H}_{32}$	✗	✓

با هم بیندیشیم صفحه ۵

- آ) شکل (۱) اسید چرب و شکل (۲) استر بلند زنجیر است.

ب






پ

ت) وان دروالس، زیرا بخش بزرگی از مولکول را بخش ناقطبی (زنجیر بلند کربنی) تشکیل داده است.
ث) با توجه به اینکه بخش بزرگی از مولکول‌های آنها را زنجیرهای بلند هیدروکربنی و آب‌گریز تشکیل می‌دهد، انحلال پذیری بسیار ناجیزی در آب دارند به طوری که در عمل، چربی‌ها در آب حل نمی‌شوند.

(1-2)



ب) بخش قطبی، آب‌دوست و بخش ناقطبی آن، آب‌گریز است.

پ) نیروی جاذبه میان مولکول‌های آب و صابون به اندازه‌ای است که سبب حل شدن و پخش شدن صابون در آب می‌شود. به دیگر سخن، نیروی جاذبه میان مولکول‌های آب و صابون از میانگین نیروهای جاذبه میان مولکول‌های آب و میان مولکول‌های صابون بیشتر است.

ت) صابون دارای مولکول‌های دو بخشی است که به کمک بخش قطبی به طور عمدۀ در آب و به کمک بخش ناقطبی به طور عمدۀ در آب و روغن حل می‌شود. رفتاری که از مولکول‌های مانند آن انتظار می‌رود.

۷ صفحه ماید بیا ز خود را

- 1

نوع مخلوط ویژگی	سوسپانسیون	کلوئیدها	محلول
رفتار در برابر نور	نور را پخش می کند	نور را پخش می کنند	مسیر عبور نور مشخص نیست
همگن بودن	ناهمگن	ناهمگن	همگن
پایداری	ناپایدار است / ته نشین نمی شود	پایدار است / ته نشین نمی شود	پایدار است / ته نشین نمی شود
ذره های سازنده	ذره های ریز ماده	توده های مولکولی و یونی	یون ها و مولکول ها


۲- کلوبید همانند سوسپانسیون مخلوطی ناهمگن است و نور را پخش می‌کند در حالی که همانند محلول، پایدار است و تهنهشین نمی‌شود.

خود را بیازمایید صفحه ۹

- آ) با افزایش دما، قدرت پاک‌کنندگی صابون افزایش می‌یابد.
- ب) افزودن آنزیم به صابون، قدرت پاک‌کنندگی را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.
- پ) خیر. به طوری که صابون آنزیم‌دار در دمای ۴۰ درجه سلسیوس همه لکه را از روی پارچه نخی زدوده است، در حالی که درصد از لکه بر روی پارچه پلی‌استر باقی مانده است.

خود را بیازمایید صفحه ۱۱

(آ)



- ب) شباهت: همانند صابون دارای یک بخش قطبی و یک بخش ناقطبی است. تفاوت: در بخش ناقطبی افزون بر زنجیر هیدروکربنی دارای حلقه بنزنی است. در بخش قطبی به جای COO^-Na^+ - دارای SO_3^-Na^+ - است.
- پ) همانند صابون دارای مولکول‌های دوبخشی است، از سر قطبی در آب و از سر ناقطبی با مولکول‌های چربی در ارتباط است. به این ترتیب می‌تواند همانند پلی میان مولکول‌های آب و چربی عمل کند، روندی که به تدریج لکه‌های چربی را می‌زداید.

با هم بینندیشیم صفحه ۱۲

- ۱- جوهرنمک و سرکه سفید، خاصیت اسیدی اما صابون و محلول سود خاصیت بازی دارند.
- ۲- آ) این مخلوط خاصیت بازی دارد که در واکنش با چربی‌ها و روغن‌ها موادی همانند صابون تولید می‌کنند. موادی که در آب حل شده و خود یک پاک‌کننده هستند.
- ب) چون واکنش گرماده است با افزایش دما قدرت پاک‌کنندگی افزایش می‌یابد. همچنین دما سبب ذوب شدن چربی نیز می‌شود پس شناور شده و شسته می‌شود.
- پ) افزون بر تولید پاک‌کننده و افزایش دما، تولید گاز در این واکنش با ایجاد فشار و رفتار مکانیکی باز کردن مجاري را تسهیل می‌کند. به عبارت دیگر هنگام عبور از لابه‌لای مواد، خلل و فرج ایجاد می‌کند و آنها را سست‌تر می‌کند.

با هم بینندیشیم صفحه ۱۴

- ۱- آ) یون $\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$ ، یونی که در هر محلول (۲) و (۳) به طور مشترک یافت می‌شود.
- ب) یون $\text{OH}^-(\text{aq})$ ، یونی که در هر محلول (۱) و (۴) به طور مشترک یافت می‌شود.
- پ) اسید آرنيوس در آب باعث افزایش غلظت یون هیدروونیوم و باز آرنيوس در آب باعث افزایش غلظت یون هیدروکسید می‌شود.







آ) گاز هیدروژن کلرید، یک $\frac{\text{اسید}}{\text{باز}} \text{ آرنیوس به شمار می‌رود، زیرا در آب سبب افزایش غلظت یون} \frac{\text{هیدرونیوم}}{\text{هیدروکسید}} \text{ می‌شود.}$

ب) سدیم هیدروکسید جامد، یک $\frac{\text{اسید}}{\text{باز}} \text{ آرنیوس به شمار می‌رود، زیرا در آب سبب افزایش غلظت} \frac{\text{هیدرونیوم}}{\text{هیدروکسید}} \text{ می‌شود.}$

خود را بیازماید صفحه ۱۶




(آ) Li_2O باز آرنیوس هستند زیرا با حل شدن در آب، باعث افزایش غلظت یون‌های هیدروکسید شده‌اند.

(ب) N_2O_5 و SO_3 اسید آرنیوس هستند زیرا با حل شدن در آب، باعث افزایش غلظت یون‌های هیدرونیوم شده‌اند.



رنگ کاغذ PH در محلول	نوع اکسید		فرمول شیمیایی	نام ترکیب شیمیایی
	بازی	اسیدی		
سرخ		✓	SO_3	گوگرد تری اکسید
سرخ		✓	CO_2	کربن دی اکسید
آبی	✓		CaO	کلسیم اکسید
آبی	✓		Na_2O	سدیم اکسید



خود را بیازماید صفحه ۱۷





با هم بیندیشیم صفحه ۱۸

-۱



۲- آ) HX به طور کامل یونیده شده است اما HA به طور جزئی.

ب) نمودار سمت راست انحلال HCl و نمودار سمت چپ HF را نشان می‌دهد، زیرا هیدروکلریک اسید به طور کامل اما HF به طور جزئی یونیده می‌شود.

۳- آ) برابر با یک است زیرا همه مولکول‌های HCl در آب یونیده می‌شوند. در واقع صورت و مخرج کسر با یکدیگر برابرند.

(ب)

$$\alpha = \frac{۲۴}{۱۰۰} = ۰\% ۲۴ \quad \text{یا } \% ۲/۴$$

خود را بیازماید صفحه ۱۹

۱- چون نیتریک اسید یک اسید قوی است پس در محلول به طور کامل یونیده شده و همه مولکول‌های آن به یون تبدیل می‌شوند

$$[\text{H}^+] = [\text{NO}_3^-] = 0/2 \text{ mol. L}^{-1}$$

۲- غلظت مولی اسید حل شده $1/۰$ مولار است اما از این مقدار تنها $1/۳۵ \times 10^{-۳}$ مولار آن یونش یافته از این رو:

(آ)



$$\alpha = \frac{1/۳۵ \times 10^{-۳}}{۰/۱} \times 100 = \% ۱/۳۵ \quad \text{(ب)}$$

با هم بیندیشیم صفحه ۲۲

آ) زیرا به ازای هر مولکول HF که در آب یونیده می‌شود یک یون F^- (aq) همراه با یک یون H^+ (aq) تولید می‌شود.

(ب)

$K = \frac{[\text{H}^+][\text{F}^-]}{[\text{HF}]}$	غلاظت تعادلی گونه‌های شرکت‌کننده (مول بر لیتر)			شماره محلول
	$[\text{H}^+]$	$[\text{F}^-]$	$[\text{HF}]$	
$۵/۸۹ \times 10^{-۴}$	$۱/۷۵ \times 10^{-۴}$	$۱/۷۵ \times 10^{-۴}$	$۰/۵۲$	۱
$۵/۹۱ \times 10^{-۴}$	$۱/۳۱ \times 10^{-۴}$	$۱/۳۱ \times 10^{-۴}$	$۰/۲۹$	۲
$۵/۹۰ \times 10^{-۴}$	$۲/۴۲ \times 10^{-۴}$	$۲/۴۲ \times 10^{-۴}$	$۱/۰$	۳

پ) این یافته‌های تجربی نشان می‌دهد در یک دمای معینی برای هر سامانه تعادلی، فقط یک مقدار ثابت برای K وجود دارد. ت) خیر زیرا مطابق جدول، با انحلال مقادیر متفاوت از HF در آب و ایجاد یک سامانه تعادلی، برای K تنها یک مقدار در دمای اتفاق به دست آمده است.

۲- از آنجا که در محلول استیک اسید به ازای یونش هر مولکول $\text{CH}_۳\text{COOH}$ تنها یک یون $\text{CH}_۳\text{COO}^-$ (aq) و یک یون H^+ (aq) تولید می‌شود پس:

$$[\text{CH}_۳\text{COO}^-] = [\text{H}_۳\text{O}^+] = ۶ \times ۱۰^{-۴} \text{ mol. L}^{-1} \quad (\alpha)$$

$$K = \frac{[\text{CH}_۳\text{COO}^-][\text{H}_۳\text{O}^+]}{[\text{CH}_۳\text{COOH}]} = \frac{(۶ \times ۱۰^{-۴})(۶ \times ۱۰^{-۴})}{۲ \times ۱۰^{-۴}} = ۱/۸ \times ۱۰^{-۵} \quad \text{(ب)}$$



خود را بیازماید صفحه ۲۴

- آ) در ظرف (آ) زیرا تولید حباب‌های گاز هیدروژن آشکارتر است.
- ب) در ظرف (آ) زیرا هرچه غلظت واکنش‌دهنده‌ها (یون H_3O^+) بیشتر باشد سرعت واکنش بیشتر است.
- پ) $K_{\text{a}1} > K_{\text{a}2}$ زیرا در شرایط یکسان، هرچه غلظت یون هیدرونیوم در محلول یک اسید بیشتر باشد، ثابت یونش آن بزرگ‌تر خواهد بود.
- ۲- نیتریک اسید و سولفوریک اسید مطابق جدول ۱، اسید قوی هستند در حالی که کربنیک اسید یک اسید ضعیف است به همین دلیل غلظت یون هیدرونیوم در باران اسیدی بیشتر از باران معمولی است.

پیوند با ریاضی صفحه ۲۴

-۱

(آ)

$$2 = 10^{-3}$$

$$\log 3 = 0.48 \rightarrow 3 = 10^{0.48}$$

$$\log 7 = 0.85 \rightarrow 7 = 10^{0.85}$$

(ب)

$$\log 21 = \log(3 \times 7) = \log 3 + \log 7 = 0.48 + 0.85 = 1.23$$

$$\log 0.1 = \log(0.1 \times 1) = \log 10^{-1} + \log 2^{-1} = -1 + 3(0.3) = -0.1$$

$$\log ? = 1.85 = 1 + 0.85 = \log 10 + \log 7 = \log(10 \times 7) = \log 70$$

-۲

$[\text{H}^+]$	pH	خاصیت محلول
3×10^{-1}	8.52	بازی
1×10^{-4}	4	اسیدی
$1/10 \times 10^{-2}$	1.74	اسیدی

-۳

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] \rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} \rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-2/7} = 10^{-2} \times 10^{0.3} = 2 \times 10^{-3}$$

-۴

$[\text{H}^+]$	pH	خاصیت محلول
7×10^{-3}	2.15	اسیدی
$2/6 \times 10^{-4}$	3.44	اسیدی
4×10^{-12}	11.4	بازی
1	0	اسیدی

با هم بینندی‌شیم صفحه ۲۶

۱- آ) مطابق معادله واکنش به ازای هر مولکول آب که یونیده می‌شود یک یون هیدرونیوم و یک یون هیدروکسید تولید خواهد شد. از این‌رو در آب خالص $[H^+] = [OH^-]$ است پس:

$$[H^][OH^-] = 10^{-14} \rightarrow [H^] = 10^{-14} \rightarrow [H^] = 10^{-7} = [OH^-]$$


$$pH = -\log[H^] = -\log 10^{-7} \quad (b)$$

۲- آ) ماده (۲) زیرا باعث افزایش غلظت یون هیدرونیوم در سامانه شده است.

ب) در همه محلول‌های بازی $[H^] > [OH^-]$ است.


پ) خیر زیرا در همه محلول‌های آبی (اسیدی، بازی یا خنثی) یون‌های هیدرونیوم و هیدروکسید وجود دارند اما مقدار آنها متفاوت است. به طوری که در محلول‌های اسیدی $[H^] > [OH^-]$ اما در محلول‌های بازی $[OH^-] > [H^]$ است.

-۳



این طرح نشان می‌دهد که برای هر محلول آبی در دمای اتاق، $[H^][OH^-] = 10^{-14}$ برقرار است و با افزایش غلظت یکی از غلظت دیگری کاسته می‌شود اما همواره در این دما، حاصل ضرب غلظت این یون‌ها برابر با 10^{-14} است.

-۴



خود را بیازمایید صفحه ۲۸

- ۱ pH محلول هیدروکلریک اسید کمتر است زیرا در شرایط یکسان، غلظت یون هیدرونیوم در محلول آن بیشتر است.
-۲

درصد یونش	pH	$[OH^-]$	$[H^+]$	غلظت محلول	نام محلول
۱۰۰	۲/۴	$2/5 \times 10^{-12}$	$0/004$	$0/004$	هیدروکلریک اسید
۲/۵	۴	10^{-10}	$0/0001$	$0/004$	هیدروفلوریک اسید
۱۰۰	۲/۷	5×10^{-11}	2×10^{-4}	2×10^{-4}	نیتریک اسید
	۸/۵۲	$2/3 \times 10^{-6}$	3×10^{-9}		نمونه‌ای از آب یک دریاچه

خود را بیازمایید صفحه ۲۹

- ۱ آ) محلول (۲) زیرا شدت روشنایی کمتر لامپ نشان از وجود یون‌های کمتری در این محلول است. این رفتار، ضعیفتر بودن این باز را تأیید می‌کند.
ب) محلول (۱)، محلول باز قوی است که می‌تواند در واکنشی گرماده با مواد موجود در لوله سریع‌تر واکنش دهد.
-۲ آ) محلول یک باز قوی را نشان می‌دهد که در آن:

$$[KOH] = [K^+] = [OH^-] = \frac{0/02 \text{ mol}}{0/1 \text{ L}} = 0/2 \text{ mol.L}^{-1}, [H^+][OH^-] = 10^{-14}, [H^+] = 5 \times 10^{-14}$$

(ب)

$$pH = -\log[H^+] = -\log(5 \times 10^{-14}) = 13/3$$

خود را بیازمایید صفحه ۳۲

- ۱ $pH = -\log[H^+] = -\log(3 \times 10^{-2}) = 2/52$
- ۲ $[H^+] = 10^{-pH} = 10^{-2/5} = 10^{0.2} \times 10^{-2} = 2 \times 10^{-2}$
- ۳ آ) چون سدیم هیدروژن کربنات (جوش شیرین) برای خنثی کردن بخشی از اسید معده به کار می‌رود پس باید دارای خاصیت بازی باشد.
ب) به دلیل اینکه جوش شیرین خاصیت بازی دارد با افزایش خاصیت بازی شوینده‌ها می‌توان قدرت پاک کردن چربی را افزایش داد.



پاسخ تمرین‌های دوره‌ای فصل ۱

- ۱- آ) ثابت یونش کوچک نشان‌دهنده میزان یونش کم و غلظت کم یون‌ها در محلول است.
- ب) اغلب اسیدهای شناخته شده (آلی و معدنی) ضعیف هستند به طوری که مصرف خوارکی‌ها و داروها و همچنین استفاده از بسیاری پاک‌کننده‌های گوناگون، این ویژگی را تایید می‌کند.
- پ) نیتریک اسید، یک اسید قوی است (K_a بزرگ). از این‌رو در محلول آن، یونش به طور کامل رخ‌می‌دهد و به ازای یونش هر HNO_2 در محلول، یک یون هیدرونیوم و یک یون نیترات تولید می‌شود.
- $$[\text{HNO}_2] = [\text{H}^+] = [\text{NO}_2^-] = ۰/۱ \text{ mol L}^{-1}$$
- ت) فورمیک اسید یک اسید ضعیف است ($K_a = ۱/۸ \times ۱۰^{-۴}$) از این‌رو در محلول به طور جزئی یونیده می‌شود در واقع مولکول‌های HCOOH به طور عمدی به شکل یونیده نشده در محلول وجود دارند.

۲- رنگ سرخ کاغذ pH نشانه اسیدی بودن محلول است. رسانایی الکتریکی کم آن، محلول الکتروولیت ضعیف را یادآوری می‌کند. این ویژگی‌های محلول یک اسید ضعیف است که با HCl , KOH , KBr و HCOOH الکتروولیت‌های قوی بوده اما CH_3OH غیرالکتروولیت است. NH_3 با اینکه الکتروولیت ضعیف است اما محلول آبی آن خاصیت بازی دارد.

۳- بر اساس مقدار ثابت یونش، محلول (۳) با هیدروبرمیک اسید، محلول (۲) با استیک اسید و محلول (۱) با هیدروسیانیک اسید همخوانی دارد. زیرا برای اسیدهای تکپروتون دار هرچه غلظت یون هیدرونیوم بیشتر باشد، ثابت یونش بزرگتر است.

-۴

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] = -\log(۲ \times ۱۰^{-۵}) = ۴/۷$$

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] = -\log(۴ \times ۱۰^{-۶}) = ۵/۶$$

۵- با توجه به اینکه در دمای ثابت برای محلول‌های آبی حاصل ضرب $[\text{H}^+][\text{OH}^-]$ همواره مقدار ثابتی است، از این‌رو با تغییر حجم محلول، حاصل ضرب غلظت این یون‌ها ثابت می‌ماند در نتیجه نمودار (ت) برای این توصیف مناسب است.

-۶

$$\frac{[\text{H}^+]}{[\text{OH}^-]} = ۴ \times ۱۰^{-۶} \rightarrow [\text{H}^+] = ۴ \times ۱۰^{-۶} [\text{OH}^-]$$

$$[\text{H}^+][\text{OH}^-] = ۱ \times ۱۰^{-۱۴} \rightarrow ۴ \times ۱۰^{-۶} [\text{OH}^-]^2 = ۱ \times ۱۰^{-۱۴}$$

$$[\text{OH}^-]^2 = ۰/۲۵ \times ۱۰^{-۴} \rightarrow [\text{OH}^-] = ۰/۵ \times ۱۰^{-۲} \rightarrow [\text{H}^+] = ۲ \times ۱۰^{-۴}$$

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] = -\log(۲ \times ۱۰^{-۴}) = ۳/۷$$



$$\text{pH} \rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-4/7} = 10^{0.7} \times 10^{-5} = 2 \times 10^{-5}$$

۸- آ) اسید آرنیوس، زیرا با حل شدن در آب باعث افزایش غلظت یون هیدرونیوم شده‌اند.
(ب)

$$\alpha(1) = \frac{1}{10} = 1$$

$$[\text{H}^+]_1 = \frac{10 \times 0.01 \text{ mol}}{0.05 \text{ L}} = 0.2 \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{pH}(1) = -\log[\text{H}^+]_1 = -\log(2 \times 10^{-5}) = 4.7$$

$$\alpha(2) = \frac{1}{10} = 0.1$$

$$[\text{H}^+]_2 = \frac{10 \times 0.01 \text{ mol}}{0.05 \text{ L}} = 0.2 \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{pH}(2) = -\log[\text{H}^+]_2 = -\log(2 \times 10^{-5}) = 4.7$$

$$n(\text{HX}) = 12 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{15 \text{ g}} = 0.8 \text{ mol} \rightarrow [\text{HX}] = 0.8 \text{ mol L}^{-1}$$

$$n(\text{HY}) = 8 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{16 \text{ g}} = 0.5 \text{ mol} \rightarrow [\text{HY}] = 0.5 \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{pH}(\text{HX}) = \text{pH}(\text{HY}) \rightarrow [\text{H}^+]_{\text{HX}} = [\text{H}^+]_{\text{HY}}$$

$$[\text{HX}] \times \alpha(\text{HX}) = [\text{HY}] \times \alpha(\text{HY}) \rightarrow \frac{\alpha(\text{HX})}{\alpha(\text{HY})} = \frac{[\text{HY}]}{[\text{HX}]} = \frac{0.5}{0.8} = 0.625 = 0.6$$


$\alpha(\text{HX}) = 0.6 \alpha(\text{HY}) \rightarrow \alpha(\text{HX}) > \alpha(\text{HY})$. اسید قوی‌تر از HY است.

$$\text{pH} = 12 \rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-12} \rightarrow [\text{OH}^-] = 10^{-2} = [\text{KOH}]$$

$$[\text{KOH}] = \frac{n}{V} \rightarrow 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} = \frac{n}{0.05 \text{ L}} \rightarrow n = 0.002 \text{ mol} \text{ یا } 112 \text{ g KOH}$$

$$\text{pH} = 4.7 \rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-4.7} = 10^{-4.7} \times 10^{-5} = 2 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$$

$$[\text{HNO}_3] = \frac{n}{V} \rightarrow 2 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1} = \frac{n}{0.05 \text{ L}} \rightarrow n = 0.0001 \text{ mol} \text{ یا } 0.252 \text{ g HNO}_3$$



(ب)

$$\text{?L CO}_2 = \frac{0.1 \text{ mol A}}{1 \text{ mol A}} \times \frac{1 \text{ mol CO}_2}{1 \text{ mol A}} \times \frac{2240 \text{ mL CO}_2}{1 \text{ mol CO}_2} = 224 \text{ mL CO}_2$$

(آ) $\text{B}'\text{OH}$ قوی‌تر است زیرا K_b بزرگتری دارد.

(ب) pH محلول بازی BOH کمتر است زیرا باز ضعیف‌تری است و غلظت یون هیدروکسید در آن کمتر و در نتیجه غلظت یون هیدرونیوم در آن بیشتر است. (pH با غلظت یون هیدرونیوم رابطه وارونه دارد)




پاسخ پرسش‌های درون فصل ۲

با هم بیندیشیم صفحه ۴۰

آ) از سمت چپ نخستین ساختار، اتم روی و دومین ساختار، اتم اکسیژن است.

ب) اتم روی الکترون از دست داده و اتم اکسیژن الکترون گرفته است.


پ) اتم روی، اکسایش و اتم اکسیژن، کاهش یافته است.



ث) نیم واکنش نخست، اکسایش است زیرا در آن اتم‌های روی الکترون از دست داده‌اند (نیم- واکنش تولید الکترون) و نیم واکنش دوم، کاهش است زیرا در آن اتم‌های اکسیژن الکترون گرفته‌اند (نیم واکنش مصرف الکترون).
ج) روی گونه کاهنده و اکسیژن گونه اکسنده است.

خود را بیازماید صفحه ۴۲

۱- آ) روی، اکسایش یافته زیرا الکترون از دست داده و به یون‌های $\text{Zn}^{2+}(\text{aq})$ تبدیل شده در حالی که یون‌های هیدروژن کاهش یافته‌اند زیرا با گرفتن الکترون به اتم‌ها و سپس به مولکول‌های $\text{H}_2(\text{g})$ تبدیل شده‌اند.






ت)

در این واکنش، اتم‌های روی الکترون کاهش کاهش داده و کاهش یافته‌اند و سبب اکسایش اکسایش دارند. در حالی که یون‌های هیدروژن شده‌اند، از این رو اتم‌های روی نقش کاهنده دارند.

الکترون از دست داده و کاهش یافته‌اند و سبب اکسایش اتم‌های روی شده‌اند، از این رو کاهش اکسایش دارند. یون‌های هیدروژن نقش کاهنده دارند.

-۲





خود را بیازماید صفحه ۴۳

آ) تغییر دمای مخلوط واکنش نشانه انجام واکنش شیمیایی است. چون دمای مخلوط واکنش افزایش یافته پس یک واکنش گرماده رخ داده است.



(ب)



پ) هرچه افزایش دما بیشتر باشد، نشان‌دهنده تولید گرمای بیشتر است. به دیگر سخن تفاوت آنتالپی واکنش‌دهنده‌ها از فراورده‌ها بیشتر خواهد بود. این ویژگی پایداری بیشتر فراورده‌ها از یک سو و واکنش‌پذیری بیشتر واکنش‌دهنده‌ها را از سوی دیگر نشان می‌دهد.

ت) با توجه به داده‌های جدول، واکنش‌پذیری روی بیشتر از آهن و آهن نیز بیشتر از مس است. طلا دارای کمترین واکنش‌پذیری در میان این چهار فلز است.






ث) چون Zn(s) واکنش‌پذیری بیشتری از Cu(s) دارد، انتظار می‌رود واکنش میان Cu(s) و $\text{Zn}^{2+}(\text{aq})$ رخ ندهد (تصویر حاشیه در همین صفحه، درستی این پیش‌بینی را تایید می‌کند).

با هم بینندیشیم صفحه ۴۵

آ) نیم واکنش در نیم سلول آند:

نیم واکنش در نیم سلول کاتد:

واکنش کلی سلول:



ب) روی، الکترود آند و مس، الکترود کاتد است.


پ) حرکت الکترون‌ها در مدار بیرونی از نیم‌سلول روی به سوی نیم‌سلول مس است، زیرا فلز روی با واکنش‌پذیری بیشتر نسبت به فلز مس، الکترون از دست می‌دهد و باعث شارش الکترون‌ها در مدار بیرونی می‌شود.

ت) با گذشت زمان و انجام نیم واکنش اکسایش در آند، اتم‌های بیشتری از تیغه (الکترود) روی اکسایش یافته و به شکل $\text{Zn}^{2+}(\text{aq})$ وارد محلول می‌شوند در حالی که هم‌زمان با آن با انجام نیم واکنش کاهش در کاتد، کاتیون بیشتری از $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$ کاهش یافته و روی تیغه الکترود می‌نشیند.

خود را بیازماید صفحه ۴۶

آ) الکترود مس، علامت منفی و الکترود نقره، علامت مثبت خواهد داشت.

(ب)





پ) با انجام واکنش از جرم تیغه (الکترود) مس کاسته و بر جرم تیغه (الکترود) نقره افزوده می‌شود.

ت) جهت حرکت یون‌های $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$ از نیم‌سلول مس به نیم‌سلول نقره است در حالی که آنیون‌ها از نیم‌سلول نقره به سوی نیم‌سلول مس مهاجرت می‌کنند.

خود را بیازماید صفحه ۴۸

آ) منیزیم، الکترود آند و نقره، الکترود کاتد خواهد بود زیرا منیزیم واکنش پذیرتر (کاهنده‌تر) از نقره بوده E° منفی‌تر آن تأییدکننده این ویژگی است.

$$E^\circ(Ag^+/Ag) = +0.8V \quad , \quad E^\circ(Mg^{2+}/Mg) = -0.37V$$



ب) نیم واکنش اکسایش در نیم سلول آند:

نیم واکنش کاهش در نیم سلول کاتد:

واکنش کلی سلول:

پیوند با ریاضی صفحه ۴۸


-۱

$$E^\circ(Cu^{2+}/Cu) = +0.24V \quad , \quad E^\circ(Zn/Zn^{2+}) = -0.76V$$

۲- چون E° نیم سلول روی منفی‌تر از نیم سلول مس است، پس نیم سلول روی، آند و نیم سلول مس، کاتد خواهد بود.

۳- چون emf سلول برابر با $+0.1V$ است پس بايد تفاوت E° دو نیم سلول برابر با اين مقدار مثبت باشد و اين مقدار در صورتی به دست مي آيد که از رابطه آند - کاتد $emf = E^\circ_{کاتد} - E^\circ_{آند}$ استفاده شود.


(۴-۵)



ب) نیم سلول‌ها در تشکیل سلول گالوانی هنگامی بیشترین emf را ایجاد می‌کنند که تفاوت یا فاصله E° آنها در سری الکتروشیمیایی بیشتر باشد.

۵- نخست از روی معادله واکنش گونه‌های اکسایش و کاهش یافته را بیابید و آنها را به کاتد و آند نسبت دهید.

اکسایش	کاهش
یافته (آند)	یافته (کاتد)



در واقع نیم سلول منیزیم، نقش آند و نیم سلول طلا، نقش کاتد دارد.

اینک با استفاده از جدول E° و فرمول emf ولتاژ سلول را حساب کنید:


$$emf = E^\circ_{کاتد} - E^\circ_{آند}$$

$$= (+1.5V) - (-0.37V) = +1.87V$$



خود را بیازماید صفحه ۵۱

- آ) روش ۱، هرچه مراحل تبدیل و انتقال انرژی بیشتر باشد، میزان اتلاف انرژی به شکل گرمای بیشتر است.
ب) روش ۲، هرچه میزان اتلاف انرژی به صورت گرمای کمتر باشد، کارایی (بازده) بیشتر است.




با هم بیندیشیم صفحه ۵۲

(۱-۱)


(ب) و (پ)

اکسایش یافته
(کاهنده)


کاهش یافته
(اکستنده)



-۲



(۱-۳)




$$emf = E^\circ_{\text{آنده}} - E^\circ_{\text{کاتد}}$$

(ب)

$$= (+1/23 V) - (0/00 V) = +1/23 V$$

کاهنده


اکستنده



(۱-۴)

ب) سوخت هیدروژن در این نوع سلول‌ها فراورده دوستدار محیط زیست (آب) تولید می‌کند اما سوختی مانند متان افزون بر آب، گاز گلخانه‌ای CO_2 نیز تولید می‌کند.

کاهش یافته




خود را بیازماید صفحه ۵۳

(۱-۱)





اکسایش یافته





(ب)

اکسایش



(پ)


اکسایش



(ت)

کاهنده



اکسیده



(ـ۲)

کاهنده

اکسیده







(ب)

خد را بیازماید صفحه ۵۴

آ) نیم واکنش آندی (تولید الکترون و گاز اکسیژن):



نیم واکنش کاتدی (صرف الکترون و تولید گاز هیدروژن):




ب) واکنش کلی سلول:

پ) کاغذ pH پیرامون الکترود آند به دلیل تولید یون‌های $H^+(aq)$ به رنگ سرخ و پیرامون الکترود کاتد به دلیل تولید یون‌های $OH^-(aq)$ به رنگ آبی درمی‌آید.




زیرنویس شکل ۱۲ صفحه ۵۵



خود را بیازمایید صفحه ۵۵



با هم بیندیشیم صفحه ۵۷



۱- آهن در حضور رطوبت و اکسیژن نخست به Fe^{++} و سپس به

Fe^{++} اکسایش می‌یابد که منجر به تولید زنگ آهن می‌شود.

(ب)

(پ)

(ت)

۲- آ) زیرا در محیط اسیدی E° برای کاهش اکسیژن $V = 1/23$ و برای کاهش اکسیژن $V = 40/40$ است.

این ویژگی emf بزرگتری را در محیط اسیدی برای چنین واکنشی رقم می‌زند و بر میزان خوردگی می‌افزاید.

ب) فلز طلا برای انجام واکنش باید اکسایش یابد. به دیگر سخن در تشکیل یک سلول باشد نقش آن داشته باشد، E° آن در

مقایسه با E° دیگر نیم‌سلول‌ها نشان می‌دهد که نمی‌تواند به عنوان کاهنده (الکترود آن) عمل کند.

**خود را بیازماید صفحه ۵۹**


(آ) آهن، قلع



پ) زیرا فلز روی در آهن گالوانیزه در طول مدت نگهداری مواد غذایی با آنها واکنش داده و ممکن است باعث فساد و مسمومیت آنها شود. از سوی دیگر پس از استفاده از مواد غذایی و ایجاد خراش در بسته‌بندی‌ها از جنس حلبی به دلیل واکنش پذیری بیشتر آهن از قلع، در این فلز خوردگی سریع‌تر و آسان‌تر رخ می‌دهد.

خود را بیازماید صفحه ۶۰

(آ) منفی




پ) زیرا باید یون‌های $\text{Ag}^+(\text{aq})$ در الکترولیت موجود باشند تا هنگام کاهش یافتن در کاتد به شکل یک لایه از فلز نقره بر سطح جسم آبدادنی بنشینند.

پاسخ تمرین‌های دوره‌ای فصل ۲

۱- آ) پلاتین فلزی با واکنش پذیری کم و $E^\circ = +1/2 \text{ V}$ است که می‌تواند در بدن برای مدت‌های طولانی ویژگی‌های خود را حفظ کند.

ب) فلوئور فعال‌ترین نافلز و اکسنده‌ترین گونه در جدول پتانسیل کاهشی استاندارد با $E^\circ = +2/87 \text{ V}$ است. عنصری که تمایل دارد از دیگر گونه‌ها الکترون بگیرد و به یون‌های فلوئورید تبدیل شود.

(پ)




۲- نمودار ۲، زیرا در سلول $\text{Zn}-\text{Cu}$ با گذشت زمان به دلیل اکسایش تیغه روی $[\text{Zn}^{2+}]$ افزایش یافته در حالی که به دلیل کاهش یون‌های مس، $[\text{Cu}^{2+}]$ کم می‌شود.

۳- نخست آند و کاتد را به کمک مفهوم اکسایش و کاهش از روی معادله واکنش مشخص کنید.




$$\text{emf} = E^\circ = (+^\circ/\Lambda^\circ \text{ V}) - E^\circ = (\text{آند}) - (\text{آند}) = -1/18 \text{ V}$$


عنصر Mn است



(ب)




(ب)




-4

(ا)




(ب)




-5

(ا)



(ب)

اکسنده کاهنده
کاهنده اکسایش می‌یابد اکسایش می‌یابد



Zn اکسایش یافته از این رو نقش آند دارد در حالی که نقره کاهش یافته و نقش کاتد را دارد.

۷- آ) قوی ترین اکسنده: $\text{A}^+(aq)$ ضعیف‌ترین اکسنده: $\text{D}^{3+}(aq)$

ب) قوی ترین کاهنده: A(s) ضعیف‌ترین کاهنده: D(s)





پ) گونه‌هایی می‌توانند $\text{C}^{3+}(aq)$ را اکسید کنند که اکسنده تر از آن باشند یعنی E° بزرگتر (ثبتت‌تری) داشته باشند. بنابراین $\text{C}^{3+}(aq)$ را به $\text{A}^{2+}(aq)$ و $\text{B}^{2+}(aq)$ اکسید کنند.

۸- ترتیب اکسندگی از:

واکنش (۱)

واکنش (۲)

واکنش (۳)







بنابراین:

ترتیب کاهنده‌گی از:

واکنش (۱)

واکنش (۲)

واکنش (۳)



بنابراین:

اکسنده ضعیف \longrightarrow اکسنده قوی

توجه:

کاهنده ضعیف \longrightarrow کاهنده قوی


۹- از جدول داریم:

$$E^\circ(\text{Cu}^{4+}/\text{Cu}) = +0/34 \text{ V}$$

$$E^\circ(\text{Fe}^{4+}/\text{Fe}) = -0/44 \text{ V}$$

$$E^\circ(\text{H}^+/\text{H}) = +0/0 \text{ V}$$

اگر محلول هیدروکلریک اسید در ظرف آهنی یا مسی قرار بگیرد، ممکن است واکنش‌های زیر انجام شود:



با توجه به اینکه E° آهن منفی است و اکنش (I) انجام شده و باعث سوراخ شدن ظرف خواهد شد. اما E° مس مثبت است. پس واکنش نمی‌دهد، از این‌رو ظرف مسی برای نگهداری محلول این اسید مناسب‌تر است.

۱۰- اتصال دو نیم‌سلول X و Y و برقاری جریان الکتریکی از اتم‌های X به اتم‌های Y نشان می‌دهد قدرت کاهنگی عنصر X بیشتر از عنصر Y است و نقش آند را در سلول گالوانی تشکیل شده دارد.

همچنین اتصال دو نیم‌سلول X و هیدروژن و جاری شدن الکترون‌ها از اتم X به سمت نیم‌سلول هیدروژن نشان می‌دهد قدرت کاهنگی X از هیدروژن بیشتر است و از آنجایی که E° هیدروژن برابر صفر در نظر گرفته شده، پس $< (X)$ است. بنابراین emf سلول گالوانی تشکیل شده از X و Y به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\text{emf} = E^\circ_{\text{آند}} - E^\circ_{\text{کاتد}} = E^\circ_Y - E^\circ_X = +0.34 - (-0.25) = +0.59 \text{ V}$$

$E^\circ(Y)$ نمی‌تواند منفی باشد زیرا برای یک سلول گالوانی $>$ emf است.

۱۱- آ) E° کم (منفی‌تر) نشان‌دهنده نیم‌سلول آند است و در آن نیم‌واکنش اکسایش انجام می‌شود. این ویژگی نشان می‌دهد در این سلول، نیم‌واکنش نخست در جهت برگشت انجام خواهد شد و نیم‌واکنش دوم (به عنوان نیم‌سلول کاتدی) به شکل نوشته شده انجام می‌شود.

$$\text{emf} = E^\circ_{\text{آند}} - E^\circ_{\text{کاتد}} = E^\circ_Y - E^\circ_X = -0.83 - (-0.84) = +0.01 \text{ V}$$

ب) گاز هیدروژن سوختی گران، پرانرژی و دوستدار محیط زیست است به همین دلیل تهیه آن ارزشمند است، توجه کنید بازده و سرعت کم واکنش امکان جمع‌آوری این آن را نیز مهیا می‌کند.

۱۲- نتایجی که از مشاهده رفتارها به دست می‌آید، به صورت زیر است:

(۱) فقط فلزهای A و C با محلول M H_2O هیدروکلریک اسید و اکنش می‌دهند و گاز هیدروژن تولید می‌کنند.

نتیجه: قدرت کاهنگی A و C از هیدروژن بیشتر است و در سری الکتروشیمیایی پایین‌تر از هیدروژن قرار دارند. $< (E^\circ(A))$ و $< (E^\circ(C))$ ، اما فلزهای B و D در سری الکتروشیمیایی بالاتر از هیدروژن هستند.

(۲) با قرار دادن فلز C در محلول‌های حاوی یون‌های D^{2+} ، B^{2+} و A^{2+} به ترتیب فلزهای D، B و A رسوب می‌کنند.

نتیجه: قدرت کاهنگی فلز C از فلزهای D، B و A بیشتر است.

(۳) یون B^{2+} اکسنده قوی‌تری از D^{2+} است.

نتیجه: قدرت کاهنگی D بیشتر از B است.

از نتیجه‌گیری‌های ۱، ۲ و ۳ نتیجه کلی زیر به دست می‌آید:

$C > A > D > B$ قدرت کاهنگی:

۱۳- آ) فلز A با یون C^{2+} واکنش نمی‌دهد بنابراین قدرت کاهنگی فلز A از C کمتر است. با توجه به اینکه باید $>$ emf باشد و emf سلول گالوانی تشکیل شده از A و C برابر است با 0.58 V ، پس:

$$\text{emf} = E^\circ_{\text{آند}} - E^\circ_{\text{کاتد}} = E^\circ_A - E^\circ_C = +0.58 \text{ V}$$

$$+0.58 = E^\circ_A - 0 \Rightarrow E^\circ_A = +0.58 \text{ V}$$

با توجه به emf حاصل از سلول گالوانی B و C (که برابر با $0/31 \text{ V}$ است) و سلول گالوانی تشکیل شده از A و B (که برابر $0/89 \text{ V}$ است)، می‌توان نتیجه گرفت:

$$0/89 = E_A^\circ - E_B^\circ = 0/58 - E_B^\circ \Rightarrow E_B^\circ = -0/31$$

ب) با توجه به قسمت (آ)

کاهنده‌ترین گونه: B

اکسنده‌ترین گونه: A^{2+}

پاسخ پرسش‌های درون فصل ۳

خود را بیازمایید صفحه ۶۹

(آ)

فرمول شیمیایی	نام	SiO ₂	آلومینیم اکسید	آب	سدیم اکسید	آهن (III) اکسید	منیزیم اکسید	MgO	Au
سیلیس، (سیلیسیم دی اکسید)	طلاء و ...	آب	آهن (III) اکسید	سدیم اکسید	منیزیم اکسید	طلاء و ...	MgO	Au	...

ب) Fe₂O₃

پ) آب، زیرا ساختار یونی نداشته و برهم‌کنش آن با دیگر ذره‌ها ضعیفتر بوده و آسان‌تر جدا می‌شود.
۲- طلا (و دیگر فلزها) همانند (پ)، آب شکل (ب) و اکسید فلزها (به دلیل وجود کاتیون و آنیون) همانند شکل (آ).

با هم بیندیشیم صفحه ۷۰

CO₂ (آ)- SiO₂ (ب)

۲- آ) SiO₂ زیرا وجود و گستردگی پیوندهای اشتراکی در سرتاسر ساختار آن، ایجاد خراش (جابه‌جایی یا جدا کردن اتم از سطح) آن بسیار دشوار است.

ب) CO₂ در ساختار آن میان مولکول‌های مجزا برهم‌کنش‌های وان دروالس وجود دارد که از پیوندهای اشتراکی ضعیفتر بوده و با انرژی کمتری مولکول‌ها را می‌توان از یکدیگر دور کرد.

خود را بیازمایید صفحه ۷۱

۱- آ) (۲) چینش دو بعدی (۱) چینش سه بعدی اتم‌ها را نشان می‌دهد.

ب) ساختار (۲) زیرا ساختار لایه‌ای دارد و بین لایه‌ها نیروهای ضعیفی وجود دارد که هنگام نوشتن لایه‌هایی از آن بر سطح کاغذ می‌نشینند.

پ) الماس جامد کووالانسی سه بعدی است که در سرتاسر ساختار آن اتم‌های کربن با پیوند اشتراکی به هم متصل‌اند. این ساختار سخت برای برش شیشه مناسب است.

ت) چگالی گرافیت کمتر است (۲/۲۷ گرم بر سانتی‌متر مکعب) زیرا گرافیت به دلیل فاصله بین لایه‌ها، تعداد اتم‌های کربن کمتر در واحد حجم دارد.

۲- آ) سیلیسیم همانند الماس یک جامد کووالانسی سه بعدی است با این تفاوت که طول پیوند Si-Si از C-C در الماس بلندتر و میانگین آنتالپی آن کمتر است، از این‌رو هنگام ایجاد خراش در سطح آن اتم‌ها آسان‌تر جابه‌جا یا جدا می‌شوند.

ب) سیلیس و سیلیسیم هر دو جامد کووالانسی هستند. اما پیوندهای قوی‌تر Si-O در ساختار سیلیس سبب می‌شود که این ماده پایداری بیشتری از سیلیسیم داشته باشد و در طبیعت به میزان بیشتری یافت شود.

خود را بیازمایید صفحه ۷۴


<u>بالایی</u> <u>پائینی</u>	<u>همه</u> <u>شمار معنی از</u>	<u>کوالانسی</u> <u>مولکولی</u>
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

۲- متن پرسش نشان می‌دهد که برای توصیف مواد مولکولی از واژه‌های رایج فرمول مولکولی و نیروهای بین مولکولی استفاده می‌شود. از این‌رو موادی مانند $\text{H}_2\text{Cl}_2(\text{g})$ و $\text{Cl}_2(\text{g})$ با این واژه‌ها توصیف می‌شوند.

خود را بیازمایید صفحه ۷۶

۱- این زیرا توزیع بار الکتریکی پیرامون اتم مرکزی آن بر خلاف کربونیل سولفید متقارن است.

(آ)-۲



ب) NH_3 قطبی است زیرا توزیع بار الکتریکی پیرامون اتم مرکزی آن متقارن نیست.

۳- در کلروفرم تقارن توزیع بارهای الکتریکی وجود ندارد (شکل حاشیه) از این‌رو دارای مولکول‌های آن قطبی است و باید باریکه این مایع در میدان الکتریکی منحرف شود، در حالی که در ساختار کربن تتراکلرید توزیع بار الکتریکی متقارن بوده و گشتاور دوقطبی آن صفر است.

با هم بیندیشیم صفحه ۷۸

۱- آ) آینه‌ها ب) شاره A پ) بخار داغ

۲- آ) N_2 ، زیرا تفاوت نقطه ذوب و جوش آن کمتر است.

ب) NaCl ، زیرا تفاوت نقطه ذوب و جوش آن بیشتر بوده و در گستره دمایی بیشتری به حالت مایع است.

۳- بیشتر، قوی‌تر

با هم بیندیشیم صفحه ۸۰

۱- در شبکه بلوری ترکیب‌های یونی، آرایش یون‌ها در سرتاسر شبکه از یک الگوی تکراری پیروی می‌کند. هر کاتیون و آنیون عدد کوئوردیناسیون معینی دارد به طوری که در ساختار آنها مولکول‌های مجزا وجود ندارد.

۲- در همه گروه‌های عناصر اصلی، شعاع اتمی و شعاع یون پایدار آنها از بالا به پایین افزایش می‌یابد. در عناصر هم دوره هرچه بار الکتریکی کاتیون بیشتر باشد، شعاع آن کوچکتر و هرچه بار الکتریکی آنیون بیشتر باشد، شعاع آن بزرگتر است.

۳-

کاتیون	شعاع (pm)	آنیون	شعاع (pm)	نسبت بار به شعاع
Na^+	۹۷	F^-	۱۲۳	$1/\times 10^{-3}$
k^+	۱۳۲/۵	Cl^-	۱۸۱	$5/\times 10^{-3}$
Mg^{++}	۶۶	O^{--}	۱۴۰	$1/\times 10^{-3}$
Ca^{++}	۹۹	S^{--}	۱۸۴	$1/\times 10^{-3}$



آ) کمتر و Mg^{2+} بیشتر

ب) کمتر و O^{2-} بیشتر

پ) نیروی جاذبه میان Mg^{2+} با O^{2-} از همه بیشتر است. زیرا چگالی بار آنها بیشتر است.

ت) نیروی میان K^+ با Cl^- از همه کمتر است زیرا چگالی بار آنها کمتر است.

خود را بیازمایید صفحه ۸۲

-۱

آ) آنتالپی فروپاشی، گرمای $\frac{\text{آزاد}}{\text{مصرف}}$ شده در فشار ثابت برای فروپاشی یک $\frac{\text{مول}}{\text{گرم}}$ از شبکه یونی و تبدیل آن به $\frac{\text{آن‌های}}{\text{یون‌های}}$ گازی سازنده است.

ب) هرچه $\frac{\text{بار}}{\text{چگالی بار}}$ یون‌های سازنده یک جامد یونی کمتر باشد، شبکه آن $\frac{\text{آسان‌تر}}{\text{فسوارت‌تر}}$ فروپاشیده می‌شود.

-۲ ۷۱۷ $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ زیرا با توجه به داده‌های موجود در متن درس، آنتالپی فروپاشی شبکه (S) از KBr(s) (چگالی بار Cl^-) از NaCl (چگالی بار K^+ از Br^-) بیشتر و از KCl (چگالی بار Cl^-) کمتر است.

-۳ آ) هر چه شعاع کاتیون افزایش می‌یابد، از چگالی بار و استحکام شبکه بلور کاسته شده از این رو آنتالپی فروپاشی کاهش می‌یابد.

ب) هر چه شعاع آنیون افزایش می‌یابد، از چگالی بار و استحکام شبکه بلور کاسته شده از این رو آنتالپی فروپاشی کاهش می‌یابد.

-۴ آ) مقایسه NaF با MgF_2 اثر بار کاتیون را در افزایش آنتالپی فروپاشی شبکه نشان می‌دهد در حالی که مقایسه Na_2O و MgO اثر افزایش بار آنیون را در آنتالپی فروپاشی شبکه نشان می‌دهد.

ب) بله اغلب ترکیب‌های یونی که دارای آنتالپی فروپاشی شبکه بزرگتری هستند، نقطه ذوب بالاتری دارند.

با هم بیندیشیم صفحه ۸۳

-۱ آ) الکترون‌های ظرفیت، زیرا در فاصله‌های دورتری از هسته هستند و نیروی جاذبه هسته را کمتر احساس می‌کنند.

ب) آزادانه جابه‌جا شدن الکترون‌های ظرفیت در سرتاسر شبکه بلوری

پ) دریای الکترونی فلزها، سیالی با بار الکتریکی منفی است که با جابه‌جایی آزادانه و یکنواخت میان یون‌های شبکه، نیروی یکنواختی به کاتیون‌ها اعمال کرده و آرایش الکترونی آنها را حفظ می‌کند.

-۲ آ) (۱) خاصیت چکش‌خواری یا شکل‌پذیری و (۲) رسانایی الکتریکی فلزها

ب) هنگامی که ضربه‌ای به فلز وارد می‌شود، لایه یا لایه‌هایی از کاتیون‌ها در شبکه جابه‌جا شده و در این تغییر شکل، دریای الکترونی جاذبه میان لایه‌ها را حفظ می‌کند.

همچنین با ورود الکتریسیته ($N.e^-$) از یکسو و خروج الکترون‌ها خروج همان تعداد از الکترون‌ها و همزمان از سوی دیگر، رسانایی الکتریکی را نشان می‌دهد و این ویژگی به دلیل حرکت آزادانه و یکنواخت دریای الکترونی است.



خود را بیازماید صفحه ۸۶

(آ) $\text{V}_{\text{۲۲}}: [\text{Ar}]3d^3 4s^2$

ب) وانادیم(III) $\text{V}_{\text{۲۲}}^{3+}: [\text{Ar}]3d^1$ وانادیم(II) $\text{V}_{\text{۲۲}}^{2+}: [\text{Ar}]3d^3$

پ) با توجه به اینکه شمار الکترون‌های ظرفیت در یون‌ها متفاوت است پس باید رفتار آنها نیز متفاوت باشد، یکی از این تفاوت‌ها در رفتار، رنگ محلول نمک آنها است.

ت) نقش اکسنده را دارد زیرا اتم‌های روی با از دست دادن الکترون به Zn^{2+} (aq) تبدیل می‌شود (کاهنده). در حالی که وانادیم(V) به ترتیب با به دست آوردن الکترون به وانادیم(IV)، وانادیم(III) و وانادیم(II) کاهش می‌یابد (اکسنده).

با هم بیندیشیم صفحه ۸۷

آ) تیتانیم به دلیل دمای ذوب بالا، چگالی کم و مقاومت در برابر سایش در ساخت موتور جت به کار می‌رود.

ب) تیتانیم فلزی با چگالی کمتر بوده که در برابر خوردگی و واکنش با ذره‌های موجود در آب دریا مقاوم است.

پ) زیبایی، درخشش، شکل پذیری مناسب، چگالی کم و مقاومت در برابر خوردگی از جمله ویژگی‌های بارز تیتانیم است که در ساختار بناهای هنرمندانه به کار می‌رود.

پاسخ تمرین‌های دوره‌ای فصل ۳

d) پ

۱۴ ب)

۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ آ)

- ۲- آ) جامد‌های کووالانسی زیرا ماده‌ای سخت است که به عنوان سنباده به کار می‌رود.
 ب) چون طول پیوند Si-C در سیلیسیم کربید از C-C در الماس بیشتر و از Si-Si در سیلیسیم کمتر است پس میانگین آنتالپی پیوند میان این دو ماده خواهد بود از این‌رو سختی آن از الماس کمتر اما از سیلیسیم بیشتر است.

- ۳- آ) ترکیب‌های یونی در حالت جامد رسانای الکتریسیته نیستند زیرا در این حالت یون‌ها حرکت انتقالی ندارند و جابه‌جا نمی‌شوند، اما در حالت مذاب یا محلول در آب به دلیل جابه‌جایی یون‌ها به سوی قطب‌های ناهمنام رسانایی انجام می‌شود.
 ب) هنگامی که به جامد‌های یونی، ضربه‌ای در راستای معین وارد می‌شود با جابه‌جایی لایه یا لایه‌هایی از یون‌ها و قرار گرفتن یون‌های همنام مقابله یکدیگر، نیروهای دافعه آشکاری پدید می‌آید که لایه‌ها از هم می‌شود.





- ۴- آ) جامد‌های کووالانسی به طور عمده از عنصرهای گروه ۱۴ ساخته شده‌اند (الماس (C)، سیلیسیم (Si)، سیلیسیم کربید (SiC) و ...) از این‌رو شمار محدودی دارند. در حالی که ترکیب‌های مولکولی نوع و تعداد اتم‌های سازنده و همچنین تنوع شیوه اتصال آنها به هم بسیار بیشتر است، برای نمونه اغلب مواد آلی ترکیب‌های مولکولی هستند.
 ب) مواد یونی و مواد کووالانسی در دما و فشار اتاق، ترکیب‌هایی جامد هستند به همین دلیل ترکیب‌هایی که در دما و فشار اتاق به حالت مایع هستند، حتماً مواد مولکولی خواهند بود.
 ب) در دوره چهارم، پتاسیم فلز قلیایی با یک الکترون ظرفیت، کلسیم فلز قلیایی خاکی با دو الکترون ظرفیت و تیتانیم فلز واسطه با چهار الکترون ظرفیت است. واکنش پذیری در فلزها به سهولت تشکیل کاتیون وابسته است.

آ-۵

۲-


۳-

۴-



ب)


- ۶- آ) پروپان، زیرا توزیع بارهای الکتریکی در آن متقارن است.
 ب) دی‌متیل‌اتر، به دلیل قطبی بودن مولکول‌ها، نیروهای جاذبه قوی‌تری میان آنها برقرار می‌شود و آسان‌تر مایع می‌شوند.






پاسخ پرسش‌های درون فصل ۴

خود را بیازمایید صفحه ۹۴

- ۱- آ) NO حدود ساعت ۷ صبح و اوزون حدود ساعت ۱۰ صبح به بیشترین حد خود می‌رسد.
 ب) به دلیل وجود مقدار قابل توجهی از آلاینده NO_۲
 ب) با افزایش مقدار NO_۲ در هوای آلوده، این آلاینده با O_۲ واکنش داده و به تدریج مقدار آن کاهش می‌یابد و هم زمان با مصرف آن مطابق واکنش زیر اوزون تولید می‌شود (اوزون تروپوسفری).



- ۲- آ) CO از سوختن ناقص سوخت، SO₂ از سوختن سوخت نامرغوب و حاوی مواد گوگرددار و NO از واکنش میان N₂(g) و O₂(g) موجود در هوا در دمای بالای موتور خودرو تولید می‌شود.



- ب) وجود هیدروکربن در گازهای خروجی دو دلیل عمدی دارد یکی نامرغوب بودن سوخت و دیگری کافی نبودن اکسیژن برای سوختن آن.

خود را بیازمایید صفحه ۹۵

- آ) نمونه ماده (۲)

- ب) خیر - زیرا رفتار متفاوتی در برهمکنش با پرتوهای الکترومغناطیسی (جذب، عبور و بازتاب پرتوها) دارند.

خود را بیازمایید صفحه ۹۸

- آ) (۱) و (۳) واکنش گرماده اما (۲) واکنش‌های گرماده محتوای انرژی (آناتالپی) فراورده‌ها کمتر از واکنش‌دهنده‌ها است در حالی که در واکنش‌های گرمگیر محتوای انرژی (آناتالپی) فراورده‌ها بیشتر از واکنش‌دهنده‌هاست.

- ب) (۳) زیرا E_a آن کمتر است در واقع تعداد ذره‌های واکنش‌دهنده بیشتری در واحد زمان می‌توانند با کسب E_a به فراورده‌ها تبدیل شوند.

- پ) نمودار (۲) در واقع E_a برای واکنش سوختن فسفر سفید در دمای اتاق تأمین می‌شود و کمتر از E_a واکنش گاز هیدروژن با اکسیژن در دمای اتاق است.

با هم بیندیشیم صفحه ۹۹

- آ) زیرا E_a این واکنش به اندازه‌ای زیاد است که در دمای اتاق تأمین نمی‌شود.

- ب) جرقه، E_a واکنش را تأمین می‌کند.

- پ) توری پلاتینی و پودر روی هر دو نقش کاتالیزگر دارند.

- ت) آناتالپی واکنش





۲- نمودار با سطح نارنجی مربوط به واکنش بدون حضور کاتالیزگر و نیز با ایجاد جرقه است، به طوری که بدون کاتالیزگر انجام نمی‌شود اما در حضور جرقه E_a تأمین می‌شود. نمودار با سطح بنفش مربوط به واکنش کاتالیز شده یا پودر روی و نمودار با سطح سبز مربوط به واکنش کاتالیز شده پلاتین است (که از همه سریع‌تر انجام شده یا E_a کمتری دارد).

۳	کاهش	کاهش	ثابت می‌ماند.
	افزایش	افزایش	<u>افزایش می‌باشد.</u>

با هم بیندیشیم صفحه ۱۰۰



۱- آ) C_xH_y به گازهای CO_2 و $CO(g)$ ، $H_2O(g)$ ، گاز CO به $CO_2(g)$ و $NO(g)$ تبدیل می‌شود.

(ب)



۲- آ) زیرا E_a آنها زیاد است و در دمای اتاق تأمین نمی‌شود.

(ب)



۳- آ) قطعه A باعث کاهش مقدار آلاینده‌ها شده است (کاهش آلودگی محیط زیست) پس عامل کاهش‌دهنده آلاینده‌های خروجی از اگزوز خودروهast.

ب) عبارت دوم درست است زیرا اگر یک کاتالیزگر همه واکنش‌ها را سرعت ببخشد نیاز به دیگر کاتالیزگرها نیست در واقع هر کاتالیزگر شمار معده‌داری واکنش را سرعت می‌بخشد و در میان آنها تنها یکی از واکنش‌ها هدف و مورد نظر است.

خود را بیازماید صفحه ۱۰۲

۱- آ) هر کاتالیزگر در گستره دمایی مناسب و معین، واکنش را به بهترین شکل ممکن سرعت می‌بخشد، به دیگر سخن کاتالیزگر باید در گستره دمایی ویژه خود باشد تا عملکرد بهینه داشته باشد.

ب) پیشنهاد می‌شود در خودروها، گرمکن‌های خودکاری تعییه شود تا پیش از روشن شدن خودرو (و هنگام باز شدن سوئیچ) مبدل کاتالیستی را به دمای مناسب برساند.

۲- هر کاتالیزگر ممکن است یک یا شمار معده‌داری واکنش را تسريع کند اما همیشه برای یک واکنش با هدف معین به کار می‌رود. کاتالیزگر نباید واکنش دیگری را هم‌زمان سرعت ببخشد که فراورده‌های آن ایجاد مزاحمت نموده یا آلاینده باشند. کاتالیزگر باید در حضور مواد شیمیایی گوناگون در محیط واکنش و نیز تغییر دما کارایی خود را حفظ نماید.

خود را بیازماید صفحه ۱۰۳

آ) عبارت ثابت تعادل، کسری است که صورت آن حاصل ضرب غلظت تعادلی فراورده‌ها (مواد سمت راست) هریک به توان ضریب استوکیومتری و مخرج آن حاصل ضرب غلظت تعادلی واکنش‌دهنده‌ها (مواد سمت چپ) هریک به توان ضریب استوکیومتری است.



$$K = \frac{[NH_3]}{[N_2][H_2]} = \frac{(0/02)^3}{(0/4)(0/5)} = 0/008$$

ب)

مقدار عددی K کوچک است و نشان می‌دهد که واکنش در این شرایط با پیشرفت کمی به تعادل رسیده است.

با هم بینندیشیم صفحه ۱۰۴

-۱


K	[N ₂]	[H ₂]	[NH ₃]	تعادل کیت
۲/۲۴	۰/۰۷	۰/۵۰	۰/۱۴	(۱)
۲/۲۴	۰/۱۱	۰/۴۶	۰/۱۶	(۲)

-۲ N₂(g) و NH₃(g) (توجه کنید که غلظت N₂ از آنچه انتظار می‌رود کمتر است).

-۳ با افزودن N₂(g)، واکنش در جهت رفت پیش رفته زیرا از ۰/۱۲ = ۰/۵۰ [N₂] و [H₂] کاسته و به [NH₃] افزوده شده است.

-۴ K در این آزمایش ثابت مانده است در واقع در دمای ثابت با تغییر غلظت هر یک از مواد شرکت‌کننده K تغییر نمی‌کند.

-۵



خود را بیازمایید صفحه ۱۰۵

آ) در جهت رفت یا تولید گاز آمونیاک تا حد امکان پیش می‌رود تا به تعادل جدید برسد.


ب) در جهت رفت یا مصرف گاز هیدروژن تا حد امکان پیش می‌رود تا به تعادل جدید برسد.

خود را بیازمایید صفحه ۱۰۷

۱- آ) با افزایش حجم در دمای ثابت، فشار کاهش یافته و واکنش در جهت افزایش فشار یا شمار مول‌های گازی بیشتر می‌رود.

ب) از مول‌های NH₃ کاسته و به مول‌های N₂ و H₂ افزوده می‌شود.

-۲



-۳ آ) چون مول‌های گازی در دو سوی معادله واکنش برابر است، پس با تغییر حجم یا فشار در دمای ثابت، شمار مول‌های مواد شرکت‌کننده ثابت می‌ماند.

ب) توجه کنید با اینکه شمار مول‌های مواد شرکت‌کننده ثابت می‌ماند اما با افزایش فشار یا کاهش حجم سامانه، غلظت همه مواد شرکت‌کننده افزایش می‌یابد.




با هم بیندیشیم صفحه ۱۰۸

$$K = \frac{[\text{SO}_4^{\cdot}]^2 [\text{O}_2^{\cdot}]}{[\text{SO}_3^{\cdot}]}$$

- ب) در دمای 435°C ، زیرا K بزرگتر است.
- پ) افزایش یافته است زیرا با افزایش دما تعادل به سمت راست جابه‌جا شده است.
- ت) $\Delta H > 0$ نشان می‌دهد که واکنش در جهت رفت گرماگیر است. با این توصیف با افزایش دما واکنش در جهت مصرف گرما یعنی در جهت رفت تا حد امکان پیش می‌رود تا به تعادل جدید برسد.

-۲



- ۳-آ) کاهش یافته است.
- ب) گرماده است زیرا در جهت مصرف گرما یا در جهت برگشت پیش رفته و از مقدار فراورده NH_3 کاسته شده است.
- پ) چون واکنش در جهت رفت گرماده است پس هرچه دما پایین‌تر باشد، میزان پیشرفت واکنش (K) بیشتر است، با این توصیف ثابت تعادل را در دمای 25°C نشان می‌دهد.

خود را بیازمایید صفحه ۱۱۰

- ۱-آ) گازهای N_2 و H_2 پس از عبور از گرمکننده در حضور کاتالیزگر (s)، با یکدیگر واکنش داده و مقداری آمونیاک تولید می‌کنند. مخلوط واکنش که حاوی هر سه گاز است به محفظه سردکننده وارد شده که در ایجاد سرما و رساندن دما به حدود -40°C ، تنها NH_3 به حالت مایع تبدیل و جدا می‌شود. گازهای N_2 و H_2 موجود در مخلوط دوباره بازگردانی شده و وارد چرخه تولید آمونیاک می‌شوند.

- ب) -40°C - مناسب است زیرا در این دما تنها NH_3 مایع و جدا می‌شود (در -200°C - افزون بر NH_3 ، گاز نیتروژن نیز مایع و جدا خواهد شد).

- ۲-آ) گرماده است، نمودار نشان می‌دهد با افزایش دما مقدار فراورده کم شده است زیرا تعادل در جهت مصرف گرما یا در جهت برگشت پیش رفته است.

- ب) در همان دما و در فشار P_2 ، مقدار فراورده بیشتر شده پس واکنش در جهت رفت یا شمار مول‌های گازی کمتر پیش رفته است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در دمای ثابت، فشار افزایش یافته و $P_2 > P_1$ است.

خود را بیازمایید صفحه ۱۱۲


(آ)

نام ماده	روغن موتور	متانول	اتیلن گلیکول	پلی اتن	اتانول	بیش از ۵۰/۰۰۰ ریال
قیمت ۱۵۹ لیتر یا کیلوگرم (ریال)	بیش از ۲۰/۰۰۰ ریال	بیش از ۱۰۰/۰۰۰ ریال	بیش از ۱۰۰/۰۰۰ ریال	بیش از ۴۰۰ ریال	بیش از ۵۰/۰۰۰ ریال	بیش از ۵۰/۰۰۰ ریال

"قیمت‌ها در زمان تنظیم پاسخ‌ها از سایتها ایرانی گرفته شده و به دلیل نوسان قیمت به طور تقریبی و حداقل آن در نظر گرفته شده است."

ب) با به کارگیری دانش و فناوری برای جداسازی و خالص‌سازی اجزای سازنده نفت خام و فراوری آنها، افزون بر ایجاد اشتغال و ثروت، شرایط رشد و بپرهوری اقتصاد در سطح کشور و منطقه فراهم خواهد شد، زیرا دست‌کم مواد اولیه صنایع گوناگون و سوخت مورد نیاز تأمین خواهد شد.

خود را بیازمایید صفحه ۱۱۴




خود را بیازمایید صفحه ۱۱۶

آ) از دسته پلی‌استرهاست زیرا در واحدهای تکرارشونده آن گروه عاملی استری ($-C(=O)-O-$) وجود دارد.

ب) مونومرهای سازنده آن یک کربوکسیلیک اسید دو عاملی ($\text{HOOC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOH}$) و یک الکل دو عاملی ($\text{HOCH}_2-\text{CH}_2\text{OH}$) هستند.

با هم بینديشيم صفحه ۱۱۷



- ۱- آ) باید گروه‌های متیل در پارازایلن به گروه عاملی کربوکسیل تبدیل شوند.
 ب) عدد اکسایش کربن‌های ستاره‌دار در پارازایلن $-3-$ و در ترفنالیک اسید $3+$ است.
 پ) برای تبدیل پارازایلن به ترفنالیک اسید باید گروه‌های متیل به گروه کربوکسیل تبدیل شوند در واقع عدد اکسایش اتم‌های کربن نام برده شده باید از $-3-$ به $3+$ افزایش یا اکسایش یابد، از این‌رو واکنش تنها در حضور اکسیدهای انجام می‌شود.
 آ-۲



ب) چون برای انجام این واکنش افزون بر اکسیده به گرما هم نیاز است پس باید E_a آن زیاد باشد.

خود را بیازماید صفحه ۱۲۱


-۱



- ۲-آ) در واکنش (ii) زیرا A فراورده هدف و Z نیز یک حلال صنعتی است و هر دو فراورده از جمله مواد قابل استفاده هستند.
ب) واکنش (ii) زیرا شمار اتم‌های بیشتری از مواد واکنش‌دهنده به فراورده‌های سودمند تبدیل شده است.

پاسخ تمرین‌های دوره‌ای فصل ۴

- ۱- آ) استفاده از کاتالیزگر سبب می‌شود تا واکنش در دما و فشارهای پایین‌تری با سرعت مناسب انجام شود. به همین دلیل از مصرف انرژی می‌کاهد. کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و کاهش تولید آلاینده‌ها را در پی دارد.
- ب) با افزایش دمای یک سامانه تعادلی، واکنش در جهت مصرف گرمای اضافی یا در جهت رفت تا حد امکان پیش می‌رود تا به تعادل جدید برسد.
- پ) چون اتم اکسیژن خاصیت نافلزی بیشتری از کربن و هیدروژن دارد، با تولید ترکیب آلی اکسیژن‌دار، عدد اکسایش اتم‌های کربن متصل به آن تغییر خواهد کرد.



(آ-۲)

ب) سرعت واکنش $2\text{NOCl} \rightarrow 2\text{NO} + \text{Cl}_2$ کمتر است زیرا E_a بیشتری دارد.

- ۳- کاهش حجم سامانه در دمای ثابت نشانه افزایش فشار بر سامانه تعادلی است. به همین دلیل واکنش در جهت تولید مول‌های گازی کمتر پیش می‌رود. با این توصیف سامانه (آ) در جهت مول‌های گازی کمتر یعنی فراورده‌ها پیش خواهد رفت.

۴- آ) درست (در واکنش‌های گرمایی $E_a > \Delta H$ است)

ب) نادرست (واکنش گرمایی است)

پ) درست (پیوند فراورده‌ها $\Delta H_{\text{مجموع}} -$ پیوند واکنش‌دهنده‌ها $\Delta H_{\text{مجموع}} = \text{واکنش}$)

در واکنش گرمایی: پیوند فراورده‌ها $\Delta H_{\text{مجموع}} >$ پیوند واکنش‌دهنده‌ها $\Delta H_{\text{مجموع}}$


در واکنش گرماده: پیوند فراورده‌ها $\Delta H_{\text{مجموع}} <$ پیوند واکنش‌دهنده‌ها $\Delta H_{\text{مجموع}}$

ت) نادرست (افزایش فشار سبب می‌شود واکنش در جهت تولید مول‌های گازی کمتر یعنی تولید فراورده اوزون پیش برود).

- ۵- آ) بله واکنش به تعادل رسیده است زیرا در دو شکل سمت راست، رنگ سامانه تغییر نکرده و شمار مولکول‌های قهوه‌ای NO_2 و مولکول‌های N_2O_4 ثابت مانده است.

$$\begin{aligned} [\text{NO}_2] &= \frac{(5 \times 10^{-1}) \text{ mol}}{2 \text{ L}} = 0.25 \text{ mol L}^{-1} \\ [\text{N}_2\text{O}_4] &= \frac{(9 \times 10^{-1}) \text{ mol}}{2 \text{ L}} = 0.45 \text{ mol L}^{-1} \end{aligned} \quad \left| K = \frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{N}_2\text{O}_4]} = \frac{(0.25)^2}{0.45} = 0.139 \right. \quad \text{ب)$$

(آ)-۶




ب) تنها عدد اکسایش اتم کربن در متیل تغییر می‌کند زیرا به گروه کربوکسیل اکسایش یافته و عدد اکسایش آن از ۳- به ۳+ می‌رسد.

(پ)

ترفتالیک اسید \rightarrow محلول خلیظ پتاسیم پرمنگنات + پارازایلن (۱)

آب + دی متیل ترفتالات $\xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4}$ متانول + ترفتالیک اسید (۲)



-۷

آ) $\left\{ \begin{array}{l} \text{اتanol} \xrightarrow{\text{سولفوریک اسید}} \text{آب} + \text{گاز اتن} \\ \text{حلال چسب} \xrightarrow{\text{سولفوریک اسید}} \text{استیک اسید} + \text{اتanol} \end{array} \right.$

ب) $\left\{ \begin{array}{l} \text{اتیلن گلیکول} \rightarrow \text{ محلول آبی و رقیق پتاسیم پرمنگنات} + \text{ گاز اتن} \\ + \text{ اتیلن گلیکول} \quad \rightarrow \quad \text{ترفتالیک اسید} \quad \text{PET} \end{array} \right.$